


## ■ Entwicklung der Sozialausgaben

In absoluten Zahlen nach ausgewählten Leistungsarten, Deutschland 1991 bis 2002



Quelle: Bundesministerium für Gesundheit  
Stand: 11.2004

bpb: © 2005 Bundeszentrale  
für politische Bildung



## ■ **Entwicklung der Sozialausgaben**

**In absoluten Zahlen nach ausgewählten Leistungsarten, Deutschland 1991 bis 2002**

### ■ **Fakten**

Die Grafik zeigt die Entwicklung der finanziell bedeutendsten Sozialleistungen. Während vor allem die Ausgaben der Sozialversicherungsträger, also die der Renten- und Krankenversicherung, seit 1991 deutlich gestiegen sind, fallen die Ausgabenzuwächse bei der Arbeitsförderung, den Arbeitgeberleistungen wie Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder betriebliche Altersversorgung sowie bei der Sozial- und Jugendhilfe absolut betrachtet kleiner aus.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass es sich bei den Sozialausgaben nicht nur um Kosten und Belastungen handelt. Den Aufwendungen der Träger stehen immer auch Leistungen gegenüber, d.h. der jeweilige Empfänger profitiert von einem Zusatzeinkommen oder von der Nutzung von sozialen Diensten und Einrichtungen.

### ■ **Datenquelle**

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung,  
Sozialbudget



## ■ Entwicklung der Sozialausgaben

In absoluten Zahlen nach ausgewählten Leistungsarten, Deutschland 1991 bis 2002

|             | Renten-<br>versicherung | Kranken-<br>versicherung | Arbeits-<br>förderung | Arbeitgeber-<br>leistungen | Sozial- u.<br>Jugendhilfe |
|-------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
|             | in Mrd.                 |                          |                       |                            |                           |
| <b>1991</b> | 133,3                   | 92,7                     | 44,6                  | 45,3                       | 29,0                      |
| <b>1992</b> | 147,2                   | 106,6                    | 56,9                  | 51,5                       | 33,2                      |
| <b>1993</b> | 158,3                   | 107,1                    | 67,2                  | 51,6                       | 37,5                      |
| <b>1994</b> | 171,5                   | 116,2                    | 64,8                  | 51,1                       | 41,2                      |
| <b>1995</b> | 184,8                   | 122,1                    | 65,8                  | 52,4                       | 42,6                      |
| <b>1996</b> | 192,2                   | 126,3                    | 70,8                  | 49,7                       | 42,5                      |
| <b>1997</b> | 197,4                   | 123,7                    | 69,2                  | 47,3                       | 41,3                      |
| <b>1998</b> | 204,1                   | 125,7                    | 68,1                  | 47,7                       | 41,8                      |
| <b>1999</b> | 201,1                   | 129,1                    | 69,2                  | 51,3                       | 42,2                      |
| <b>2000</b> | 217,4                   | 132,0                    | 64,8                  | 53,6                       | 43,1                      |
| <b>2001</b> | 224,4                   | 137,1                    | 65,4                  | 55,9                       | 43,4                      |
| <b>2002</b> | 232,9                   | 141,2                    | 71,0                  | 56,0                       | 44,3                      |

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit  
Stand: 11.2004